

ALTERAÇÕES NAS MUCOSAS

- Podem ser inflamações na boca (estomatite), esófago (esofagite) e no reto (proctite). A mais frequente pós-quimioterapia é na boca (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).
- Um dos tratamentos atuais indicados é a laserterapia que pode ser realizado no leito hospitalar ou no consultório odontológico especializado na própria unidade. Pode também ser utilizado soluções de nistatina para bochechos e gargarejos (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).
- Os fatores de risco para o desenvolvimento da mucosite na boca inclui higiene oral inadequada, próteses orais mal ajustadas, nutrição, tipo de câncer e sua localização, alguns quimioterápicos específicos, cáries, fumo, doenças na gengiva, ingestão de álcool (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).
- É importante, que sempre que possível, realizar uma visita ao dentista antes de iniciar o tratamento para detecção precoce de alguma doença na gengiva, cáries, revisão de restaurações. E sempre que possível durante o tratamento (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).
- Aproveite o atendimento do profissional dentista da equipe de oncologia.

IMPORTANTE: você sabe como realizar uma boa higiene oral? A escovação dos dentes e gengivas deve ser feita com escova estreita e com cerdas macias (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).

O creme dental deve ser não abrasivo; Se houver sangramento ativo na gengiva, a escova deve ser substituída por uma espátula ou mesmo pelo

dedo forrado com gaze ou algodão (BONASSA;GATO; RODRIGUES,2022).



(CANVA,2023)

REFERÊNCIAS

MATERIAL DE SUPORTE PARA ELABORAÇÃO DA LINGUAGEM E CONTEÚDO

BONASSA, A.M.E; GATO, R.I.M; RODRIGUES, A.L. **Terapêutica Oncológica para Enfermeiros e Farmacêuticos**. 5° ed. Rio de Janeiro: Artheneu,2022.

SITE DE SUPORTE DE IMAGENS, VÍDEOS E LAYOUT

CANVA, 2023. Disponível em :

https://www.canva.com/design/DAF3eFs3o5g/PpQyRxt56_Qnj uQ9aAMMbw/edit. Acesso em: 01\01\2024

ELABORAÇÃO

Ana Carla Ramos Borges; Eda Schwartz e Débora Eduarda Duarte do Amaral Pantoni

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,2024